



### **Pupalka dvouletá – *Oenothera biennis***

Jednoletá až dvouletá, 60–200 cm vysoká rostlina se žláznatými i nežláznatými chlupy. Lodyha zelená, bez červených teček. Koruny velké, cípy širší než delší. Železnice, pustá místa na hrubší půdě či štěrku, písčovny, lomy, rumišťe, úhory. Kvete VI–IX.

Zavlečeno je u nás více amerických druhů, často s červeně tečkovanými lodyhami a kalichy, zejména na železnice; jejich určování je obtížné.



**Vrbovka úzkolistá – *Epilobium angustifolium***

Mohutná, 60–200 cm vysoká rostlina, tvořící často souvislé porosty. Listy střídavé, kopinaté. Květy v bohatém hroznu, mírně symetrické, korunní lístky celokrajné. Paseky, lesní světliny a okraje, lomy, výsypky, otevřená ruderalní stanoviště. Kveté VI–VIII.



### Vrbovka srstnatá – *Epilobium hirsutum*

Vytrvalá, chlupatá a žláznatá, 80–200 cm vysoká rostlina. Listy poloobjímavé, alespoň některé sbíhavé. Květy až 2 cm velké, se 4klanou bliznou. Břehy rybníků a vodních toků, bahnitá místa a vlhké příkopy. Kveté VI–VIII.

Podobný je druh **vrbovka malokvětá** (*E. parviflorum*), který se liší menšími květy (do 1 cm) a přisedlými, neobjímavými a nesbíhavými listy. Roste v teplejších oblastech. (C3)



**Vrbovka horská – *Epilobium montanum***

Vytrvalá, 20–80 cm vysoká rostlina. Lodyha větvená jen v horní části, listy pilovité, zelené. Květenství hustě krátce žláznaté (patrné proti světlu), květy se 4klanou bliznou. Lesy, paseky, lesní cesty, zahrady, stinná rumišťe. Kvete V–IX.



**Vrbovka chlumní – *Epilobium collinum***

Vytrvalá, 20–60 cm vysoká rostlina. Lodyha větvená odspodu, listy chudě zubaté, šedo-zelené. Květenství jen přitiskle chlupaté, květy se 4klanou bliznou. Lomy, skalnaté stráně, zídky, kamenité stráně. Kvetे VI–IX.



### Vrbovka žláznatá – *Epilobium adenocaulon*

Syn.: *Epilobium ciliatum*

Vytrvalá, 20–100 cm vysoká rostlina. Listy kratičce řapíkaté nebo přisedlé. Květenství a horní část větvené lodyhy odstále krátce žláznaté (viditelné i bez lupy v protisvětle) a přitiskle chlupaté (bez lupy neviditelné), květy s kyjovitou bliznou. Vlhké louky, různá ruderální stanoviště, podél cest; dnes nejrozšířenější vrbovka. Kvete VII–VIII. Původní v Sev. Americe.

Podobných je několik druhů našich vrbovek, které jsou jen přitiskle chlupaté, nejčastější z nich je **vrbovka čtyřhranná** (*E. tetragonum*).